

附件二十五：

Indocyanine green (ICG)檢查之給藥方法及採檢紀錄表 (XRA113)

依病人體重向藥局領取 ICG 注射劑 (循血綠注射劑 每劑含量為 25 mg)，50 公斤(含)以內領一瓶，超過 50 公斤領兩瓶，接著每瓶各以空針吸取 10 C.C.內附蒸餾水泡製溶解完全。 I.V. 注射量：0.5 mg ICG/Kg body weight，藥品濃度：2.5 mg/mL。

此項目必須抽兩支血各 3 mL 血清，一支打藥前抽(代表 0 分鐘)，另一支應於打藥後開始計時，間隔 15 分鐘要準時抽完(代表 15 分鐘)；若延誤採檢 5 分鐘，將造成結果偏低 10 % 以上。採檢後採血管應註明 0 分鐘或 15 分鐘，並且以錫箔紙包著避光及立刻送檢。

例如：體重 50 公斤之受檢者 取已泡完濃度為 2.5 mg/ mL 之溶液注射 10 C.C. (一瓶)

體重 60 公斤之受檢者 取已泡完濃度為 2.5 mg/ mL 之溶液注射 12 C.C. (一瓶多)

體重 70 公斤之受檢者 取已泡完濃度為 2.5 mg/ mL 之溶液注射 14 C.C. (一瓶多)

*.以空針抽取注射液注射時其抽取量必須先大於注射量再擠出至所需量。

*. ICG 注射劑泡製後在水溶液中較不穩定，故應於注射前才泡製並於 30 秒鐘之內打完。

*.打藥前(0 Min)之採血與注射 ICG 可使用同一手臂，打藥後(15 Min)之採血不可與注射 ICG 同一手臂。

實際操作記錄：病人姓名：_____ (簽名)

泡藥人員：_____ (簽名)

病人體重：_____公斤 注射_____C.C.

抽血日期：____月____日

打藥前抽血人員：_____ 是否 溶血

0 分鐘採檢開始時間：____點____分

ICG 打藥後結束時間：____點____分

“15”分鐘採檢結束時間：____點____分

抽血人員：_____ 是否 難抽

聯合醫事檢驗所檢體收到時間：____點____分