

大安聯合醫事檢驗所公告

公告編碼：455

日期：114年08月26日

- 公告事項：1. 檢驗項目Anti-Basement Membrane Zone Antibodies，
Anti-BMZ 基底膜帶抗體，原為外送台北病理中心改為大安聯合自行操作
2. 檢驗項目Anti-Intercellular Substance Antibodies，Anti-ICS Ab
細胞間質抗體，原為外送台北病理中心改為大安聯合自行操作

1. 114年09月01日起，檢驗項目Anti-Basement Membrane Zone Antibodies，
Anti-BMZ基底膜帶抗體，原為外送台北病理中心改為大安聯合自行操作，
說明如下：

檢驗項目：Anti-Basement Membrane Zone Antibodies，Anti-BMZ

健保編號：12066B 基底膜帶抗體

健保點數：300 (本項目不適用健保點數收費)

自費收費：800

檢體採集：血清或血漿(EDTA、Heparin、Sodium Citrate) 0.5ml(即原始全血不可少於 1ml)

報告時效：每週六核發報告，遇假日順延至下一工作日

分析方法：Indirect Immunofluorescence assay (IFA)，EUROIMMUN

參考區間：1:10(-)

報告區間：

1:10(-)、1:10(+)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、1:640(+)、>1:640(+)

臨床意義：抗基底膜帶抗體(Anti-BMZ Ab)，表現在上皮細胞的基底膜上，可幫助類天皰瘡(Pemphigoid)的診斷。抗體濃度與疾病活動性相關，可做為臨床監測病情、療效評估、判斷預後的重要參考。

類天皰瘡為最常見的皮膚水疱性自體免疫疾病。疾病盛行率會隨著年齡上升，90歲的盛行率約是65歲以下成年人的300倍。其女性罹病率較高。常見的臨床症狀為搔癢的水疱並在病灶的周圍有紅疹。

(2022年版檢驗目錄p.33)(原檢驗單位：台北病理中心、原試劑廠牌：Immco)

2. 114年09月01日起，檢驗項目Anti-Intercellular Substance Antibodies，
Anti-ICS Ab 細胞間質抗體，原為外送台北病理中心改為大安聯合自行操作，
說明如下：

檢驗項目：Anti-Intercellular Substance Antibodies，Anti-ICS Ab

健保編號：12067B 細胞間質抗體

健保點數：300 (本項目不適用健保點數收費)

自費收費：800

檢體採集：血清或血漿(EDTA、Heparin、Sodium Citrate) 0.5ml(即原始全血不可少於 1ml)

報告時效：每週六核發報告，遇假日順延至下一工作日

分析方法：Indirect Immunofluorescence assay (IFA)，EUROIMMUN

參考區間：1:10(-)

報告區間：

1:10(-)、1:10(+)、1:20(+)、1:40(+)、1:80(+)、1:160(+)、1:320(+)、1:640(+)、>1:640(+)

臨床意義：抗細胞間質抗體(Anti-ICS Ab)，為天皰瘡(Pemphigus)的血清標誌性抗體，其抗體在天皰瘡病患中的檢出率為87.5%。抗體濃度與疾病活動性相關，可做為治療監控指標。

天皰瘡為一種罕見的自體免疫水皰性疾病，表現為黏膜及皮膚一直出現水皰。主要是因為免疫系統中 IgG 抗體與細胞間的黏附分子蛋白結合，使得細胞與細胞間不再緊密排列，即所謂的棘層鬆解（Acantholysis），此為天皰瘡症狀的特徵，進一步造成黏膜與皮膚產生水皰、潰爛。

(2022年版檢驗目錄p.44)(原檢驗單位：台北病理中心、原試劑廠牌：Immco)

謹此敬告週知修正，通知事項同步公告於本所網頁

陳明輝



大安聯合醫事檢驗所
負責人陳明輝敬上